


































Übersicht Wildstauden

Vorschau	Botanischer Name	Deutscher Name	Blühzeitraum (April – Oktober)							Licht	Feuchte	Besonderheiten	Höhe [cm]	Abstand [cm]
			A	M	J	J	A	S	O					
	<i>Achillea millefolium</i>	Wiesen-Schafgarbe	A	M	J	J	A	S	O	sonnig	trocken – frisch	kalkmeidend	30–60	ca. 40
	<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermennig	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – halbschattig	trocken – frisch	kalkvertragend, Insektenpflanze, essbar	30–60	30–50
	<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	A	M	J	J	A	S	O	halbschattig	frisch – feucht	Bodendecker	7–30	20–25
	<i>Alchemilla xanthochlora</i>	Gelbgrüner Frauenmantel	A	M	J	J	A	S	O	halbschattig	frisch – feucht	essbar	15–50	30–50
	<i>Betonica officinalis</i> (Syn. <i>Stachys officinalis</i>)	Heil-Ziest	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – halbschattig	frisch – feucht	säuren- und basenvertragend, Insektenpflanze	25–75	30–40
	<i>Bistorta officinalis</i> (Syn. <i>Persicaria bistorta</i>)	Schlangen-Knöterich	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – halbschattig	frisch – feucht	kalkmeidend, Insektenpflanze	30–100	40–50
	<i>Briza media</i>	Mittleres Zittergras	A	M	J	J	A	S	O	sonnig	trocken – nass	attraktives Gras, Strukturpflanze	10–60	30–50
	<i>Centaurea jacea / nigra</i>	Wiesen- / Schwarze Flockenblume	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – halbschattig	mäßig trocken – frisch	kalkvertragend, essbar	15–60	30–40
	<i>Centaurea scabiosa</i>	Skabiosen-Flockenblume	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – halbschattig	trocken – frisch	kalkvertragend, Insektenpflanze	30–100	25–35

Vorschau	Botanischer Name	Deutscher Name	Blühzeitraum (April – Oktober)							Licht	Feuchte	Besonderheit	Höhe [cm]	Abstand [cm]
			A	M	J	J	A	S	O					
	<i>Clinopodium vulgare</i>	Wirbeldost	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – halbschattig	trocken – frisch	wärmeliebend, kalkvertragend	30–60	ca. 40
	<i>Cota tinctoria</i> (Syn. <i>Anthemis tinctoria</i>)	Färber-Hundskamille	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – halbschattig	trocken	wärmeliebend, kalkvertragend	20–50	30–40
	<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – halbschattig	frisch – feucht	zweijährig, Insektenpflanze	50–120	30–40
	<i>Dianthus carthusianorum</i>	Karthäuser-Nelke	A	M	J	J	A	S	O	sonnig	trocken	wärmeliebend, Insektenpflanze	15–45	35–50
	<i>Dianthus deltoides</i>	Heide-Nelke	A	M	J	J	A	S	O	sonnig	trocken	verträgt sandige Böden, kalkmeidend	20–45	20–30
	<i>Echium vulgare</i>	Natternkopf	A	M	J	J	A	S	O	sonnig	trocken – frisch	zweijährig, Insektenpflanze	25–80	40–60
	<i>Euphorbia cyparissias</i>	Zypressen-Wolfsmilch	A	M	J	J	A	S	O	sonnig	trocken	attraktives Blattwerk, Insektenpflanze	15–30	30–100
	<i>Galium mollugo</i> (Syn. <i>Galium album</i>)	Wiesen-Labkraut	A	M	J	J	A	S	O	sonnig	trocken – frisch	nährstoffanspruchsvoll, kalkvertragend	30–80	25–35
	<i>Helianthemum nummularium</i>	Gewöhnliches Sonnenröschen	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – halbschattig	trocken	wärmeliebend, kalkvertragend, Insektenpflanze	10–30	20–30
	<i>Hypericum perforatum</i>	Tüpfel-Johanniskraut	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – halbschattig	trocken – frisch		15–80	ca. 40

Vorschau	Botanischer Name	Deutscher Name	Blühzeitraum (April – Oktober)							Licht	Feuchte	Besonderheit	Höhe [cm]	Abstand [cm]
			A	M	J	J	A	S	O					
	<i>Iris pseudacorus</i>	Sumpf-Schwertlilie	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – halbschattig	nass	nährstoff-anspruchsvoll, Teichrand-Pflanze	50–100	10–80
	<i>Knautia arvensis</i>	Wiesen-Witwenblume	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – halbschattig	trocken – frisch	wärmeliebend, kalkvertragend, Teichrand-Pflanze	30–60	40–50
	<i>Leucanthemum ircutianum / vulgare</i>	Wiesen-/Frühe Margerite	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – halbschattig	trocken – frisch	basenvertragend, Insektenpflanze	30–60	30–40
	<i>Linaria vulgaris</i>	Gewöhnliches Leinkraut	A	M	J	J	A	S	O	sonnig	trocken – frisch	nährstoffarmer Boden, Insektenpflanze	20–75	40–60
	<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – halbschattig	trocken – frisch	basenvertragend, Polsterpflanze	5–30	ca. 30
	<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gewöhnlicher Gilbweiderich	A	M	J	J	A	S	O	halbschattig	feucht – nass	Teichrand-Pflanze	50–150	40–50
	<i>Lythrum salicaria</i>	Blut-Weiderich	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – halbschattig	feucht – nass	Teichrand-Pflanze, Insektenpflanze	30–150	40–50
	<i>Malva moschata</i>	Moschus-Malve	A	M	J	J	A	S	O	sonnig	frisch	Insektenpflanze, essbar	40–80	55–60
	<i>Malva sylvestris</i>	Wilde Malve	A	M	J	J	A	S	O	sonnig	trocken – frisch	kalkmeidend	30–100	ca. 50
	<i>Origanum vulgare</i>	Dost	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – halbschattig	trocken	kalkvertragend, Insektenpflanze	30–80	20–40

Vorschau	Botanischer Name	Deutscher Name	Blühzeitraum (April – Oktober)							Licht	Feuchte	Besonderheit	Höhe [cm]	Abstand [cm]
			A	M	J	J	A	S	O					
	<i>Potentilla recta</i>	Hohes Fingerkraut	A	M	J	J	A	S	O	sonnig	trocken	basenvertragend, Insektenpflanze	25–70	ca. 30
	<i>Potentilla verna</i> (Syn. <i>Potentilla neumanniana</i>)	Frühlings-Fingerkraut	A	M	J	J	A	S	O	sonnig	trocken – frisch	Frühblüher, Bodendecker	5–10	20–60
	<i>Poterium sanguisorba</i> (Syn. <i>Sanguisorba minor</i>)	Kleiner Wiesenknopf	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – halbschattig	trocken – frisch	basenvertragend, Polsterpflanze	15–80	25–35
	<i>Primula veris</i>	Wiesen-Schlüsselblume	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – halbschattig	trocken – frisch	kalkvertragend, Frühblüher	10–30	20–25
	<i>Prunella vulgaris</i>	Kleine Braunelle	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – halbschattig	frisch – mäßig feucht		5–30	ca. 30
	<i>Reseda luteola</i>	Färber-Wau	A	M	J	J	A	S	O	sonnig	trocken – frisch	dekorative, zweijährige Insektenpflanze	40–150	40–50
	<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	A	M	J	J	A	S	O	sonnig	trocken – frisch	wärmeliebend, basenvertragend, Insektenpflanze	30–80	ca. 40
	<i>Sanguisorba officinalis</i>	Großer Wiesenknopf	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – halbschattig	frisch – feucht	Insektenpflanze, essbar	30–150	ca. 50
	<i>Saponaria officinalis</i>	Gewöhnliches Seifenkraut	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – halbschattig	mäßig trocken – frisch		30–80	ca. 60
	<i>Scabiosa columbaria</i>	Tauben-Skabiose	A	M	J	J	A	S	O	sonnig	trocken	wärmeliebend, kalkvertragend, lange Blütezeit	10–80	ca. 30

Vorschau	Botanischer Name	Deutscher Name	Blühzeitraum (April – Oktober)							Licht	Feuchte	Besonderheit	Höhe [cm]	Abstand [cm]
			A	M	J	J	A	S	O					
	<i>Silene dioica</i>	Rote Lichtnelke	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – schattig	frisch – feucht	Insektenpflanze	20–90	30–40
	<i>Silene flos-cuculi</i> (Syn. <i>Lychnis flos-cuculi</i>)	Kuckucks-Lichtnelke	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – halbschattig	frisch – feucht	Insektenpflanze	30–80	40–50
	<i>Silene vulgaris</i>	Taubenkropf- Leimkraut	A	M	J	J	A	S	O	sonnig	trocken – frisch	wärmeliebend, kalkvertragend	10–60	ca. 30
	<i>Succisa pratensis</i>	Teufelsabbiss	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – halbschattig	frisch – feucht	Insektenpflanze	15–80	20–25
	<i>Thymus pulegioides</i>	Arznei-Thymian	A	M	J	J	A	S	O	sonnig	trocken	kalkvertragend, Insekten- und Polsterpflanze	8–40	30–40
	<i>Viscaria vulgaris</i> (Syn. <i>Lychnis viscaria</i>)	Pechnelke	A	M	J	J	A	S	O	sonnig – halbschattig	trocken – frisch	kalkmeidend, bevorzugt saure Böden	25–60	25–30

Weitere und detaillierte Informationen finden Sie auf
unserer Website:

<https://wellpflanzen.lu/>

